

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Облепиховое масло

Торговое название

Облепиховое масло

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные, 0,5 г

Состав

Один суппозиторий содержит

активное вещество - облепихи крушиновидной плодов масло (облепихового масла концентрат) 0,5 г,

вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол (бутилоксианизол), бутилгидрокситолуол (дibuнол)

основа для суппозиторий: жир твердый (витепсол (марки Н 15, W 35), суппосир (марки NA 15, NAS 50)), глицерина моностеарат

Описание

Суппозитории от оранжевого до темно-оранжевого цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения

Код АТС C05AX03

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Не описана

Фармакодинамика

Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

Показания к применению

- геморрой
- трещины заднего прохода

- язвы прямой кишки
- проктит
- эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит
- катаральный и атрофический проктит
- лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки

Способ применения и дозы

Суппозиторий освобождают от контурной упаковки при помощи ножниц, разрезав упаковку по контуру суппозитория, вводят после опорожнения кишечника глубоко в задний проход.

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 10-15 дней.

Детям до 6 лет – 1 суппозиторий 1 раз в день; 6-14 лет – 1 суппозиторий 1-2 раза в день. Курс лечения 14 дней.

При необходимости через 4-6 недель курс лечения повторяют.

Побочные действия

- аллергические реакции
- ощущение жжения в области заднего прохода.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата
- диарея

Лекарственные взаимодействия

При местном применении не описаны клинически значимые взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Беременность и лактация

Возможно применение при беременности и в период лактации.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При правильном применении передозировка препарата невозможна.

Форма выпуска и упаковка

По 5 суппозиторияев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

1 год 6 месяцев

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП-459, ул. Салганская, 7
тел.: (831) 278-80-88
факс: (831) 430-72-28
веб сайт: <https://www.stada.ru>

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения

АО «Нижфарм», Россия

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

Представительство АО «Нижфарм»
050043, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Хан-Танири, 55б
тел.: (727) 271-99-68
факс: (727) 255-33-78
e-mail: almaty@stada.kz