

# Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

## Бисакодил-Нижфарм

### Торговое название

Бисакодил-Нижфарм

### Международное непатентованное название

Бисакодил

### Лекарственная форма

Суппозитории ректальные 10 мг

### Состав

1 суппозиторий содержит

*активное вещество* – бисакодил 10 мг

*вспомогательное вещество* – жир твердый (Витепсол марки Н 15, W 35, Суппосир марки NA 15, NAS 50) – до получения суппозитория массой 1,25 г.

### Описание

Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

### Фармакотерапевтическая группа

Контактные слабительные препараты

Код АТХ А06АВ02

### Фармакологические свойства

#### *Фармакокинетика*

Бисакодил-Нижфарм – препарат контактного действия. Незначительная часть бисакодила (до 5%) всасывается из кишечника и после конъюгации в печени включается в кишечно-печеночную циркуляцию крови. Частично выделяется почками. В молоко кормящей женщины бисакодил не проникает.

#### *Фармакодинамика*

Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике. Действие наступает в течение первого часа.

### Показания к применению

– гипотонический и атонический запор (в том числе запоры у пожилых, запоры после операций и родов)

- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса)
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям

### **Способ применения и дозы**

Ректально, перед употреблением освободить суппозиторий от контурной ячейковой упаковки. Взрослым и детям старше 14 лет – 1-2 суппозитория в день, детям 10-14 лет – 1 суппозиторий в день. Систематический приём не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

### **Побочные действия**

- кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм
- аллергические реакции

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к компонентам препарата
- кишечная непроходимость, спастический запор
- ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит
- кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия
- цистит
- острый геморрой, острый проктит
- детский возраст до 10 лет

### **Лекарственные взаимодействия**

Не описаны

### **Особые указания**

Не применять в течение длительного времени.

Применять с осторожностью пациентам с печёночной и/или почечной недостаточностью.

#### *Беременность и лактация*

С осторожностью возможно применение в период беременности и лактации.

*Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не оказывает влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

### **Передозировка**

*Симптомы:* диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

*Лечение:* симптоматическое.

**Форма выпуска и упаковка**

По 5 суппозиторияев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

2 года

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

АО «Нижфарм», Российская Федерация

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел.: (831) 278-80-88

факс: (831) 430-72-28

веб сайт: <https://www.stada.ru>

**Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения**

АО «Нижфарм», Российская Федерация

***Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)***

Представительство АО «Нижфарм»

050043, Республика Казахстан,

г. Алматы, мкр. Хан-Танири, 55б

тел.: (727) 398-64-91, 398-64-92, 398-64-93, 243-45-03, 243-45-04

факс: (727) 398-64-95

e-mail: [almaty@stada.kz](mailto:almaty@stada.kz)